
Endoscopia Digestiva Superior (EGD)

Antes de que comience su procedimiento, un miembro de nuestro equipo le pedirá que firme un *consentimiento informado* indicando que usted lo entiende. Un *consentimiento informado* es cuando usted, el paciente o el representante legal, puede demostrar que entiende por qué se necesita un tratamiento o un procedimiento, cómo se llevará a cabo y los posibles riesgos.

¿Qué es una endoscopia digestiva superior (EGD)?

Utilizando un tubo pequeño y flexible, su médico examinará la parte superior de su tracto gastrointestinal (GI). Esto incluye el esófago, el estómago y el duodeno. Una endoscopia superior también se conoce como EGD (Esófago-Gastro-Duodenoscopia).

¿Por qué recomendó mi médico una EGD?

Una EGD es la mejor prueba para encontrar la causa del sangrado en el esófago, el estómago y el duodeno. Es más precisa que una radiografía para detectar inflamación, úlceras y tumores en el tracto gastrointestinal superior. Este examen puede ayudar al médico a evaluar los síntomas de náuseas, vómitos y dificultad para deglutir.

¿Cuáles son los riesgos de una EGD?

Los riesgos asociados con una endoscopia superior son raros. Las complicaciones graves incluyen:

- Por lesión del endoscopio o por la extracción de un pólipo durante la EGD puede causar sangrado durante o después del procedimiento.
- Un desgarro o un agujero (perforación) en el revestimiento del tracto gastrointestinal que requiere atención quirúrgica.
- Infección
- Aspiración que puede conducir a una infección pulmonar (neumonía).
- Una reacción al medicamento de sedación, incluyendo problemas respiratorios o cardíacos.
- Sedación o complicaciones de la EGD pueden ocasionar una lesión al feto. Avise a su médico o al personal si usted está o pudiera estar embarazada.

Los riesgos son mayores en las personas que toman esteroides o medicamentos anticoagulantes o en las personas que tienen enfermedades subyacentes significativas. También existe el riesgo de que no se detecte el cáncer o los pólipos. Comuníquese con su médico si nota dolor abdominal severo, fiebre y escalofríos, o sangrado rectal después de su procedimiento.

¿Cuáles son las alternativas?

Otras pruebas de imagenología como radiografías y tomografías computarizadas son las alternativas a una EGD. Una EGD es la única prueba que le permitirá al médico remover tejido para pruebas más extensas.